


PIANI DI GESTIONE

Per prelevare la Starna e la Pernice rossa si deve:

- Monitoraggio: 
 - primaverile
 - estivo
- Attività gestionale

STARNA

- Immissioni entro il 15 Agosto
- Pre-ambientamento
- Non più di 150 Starne/100 HA se non vi sono individui autoctoni
- Se abbiamo delle coppie, non più di 20 animali per coppia

IMMISSIONI

- Tutti gli animali devono essere marcati
- Non si immette la Pernice rossa in pianura
- Non si immette la Pernice rossa all'interno di Rete 2000

PRELIEVO

- Vi deve essere 1 coppia/100 HA in primavera (periodo pre-riproduttivo)
- Il prelievo non può superare il 15% della popolazione post riproduttiva
- Si farà riferimento alla popolazione censita in estate + 50% dei capi immessi con ricorso alle voliere d'ambientamento oppure il prelievo del 40% per animali immessi senza tecnica di pre-ambientamento

PERNICE ROSSA

- Immissioni entro il 15 Agosto
- Pre-ambientamento
- Ripopolamento senza limiti numerici in aree di presenza

PRELIEVO

- Vi deve essere 1 coppia/100 Ha in primavera (periodo pre-riproduttivo)
- Il prelievo non può superare il 15% della popolazione totale dopo il periodo riproduttivo (popolazione immessa + popolazione naturale)

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

- Mantenimento delle stoppie in inverno
- Semina sul sodo
- *Minimum tillage*
- Agricoltura biologica (contributi Bio)
- Tagli e sfalci nelle coltivazione estensive (non si sfalcia il secondo e terzo taglio)

- Incentivare i prati a sfalcio tardivo (prati polifiti o prati stabili)
- Eterogeneità delle coltivazioni erbacee (culture diverse: orzo, miglio, girasole, sorgo ...)
- Ampliare le fasce di incolti erbacei a ridosso delle coltivazioni (capezzane più larghe, fasce tampone, mantenere i fossi)
- Ampliare le superfici a prato favorendo il pascolo